

2013/2014

63. ročník Matematickej olympiády

Zadania úloh IMO

(Súťaž sa konala 7. – 13. 7. 2014.)

1. Nech $a_0 < a_1 < a_2 < \dots$ je nekonečná postupnosť kladných celých čísel. Dokážte, že existuje práve jedno celé číslo $n \geq 1$ také, že

$$a_n < \frac{a_0 + a_1 + \dots + a_n}{n} \leq a_{n+1}.$$

(Rakúsko)

2. Nech $n \geq 2$ je celé číslo. Uvažujme šachovnicu s rozmermi $n \times n$ pozostávajúcu z n^2 jednotkových štvorcových políčok. Konfiguráciu n veží na tejto šachovnici nazývame *šťastná*, ak každý riadok a každý stĺpec obsahuje práve jednu vežu. Nájdite najväčšie kladné celé číslo k také, že pre každú šťastnú konfiguráciu n veží existuje štvorec s rozmermi $k \times k$, ktorý neobsahuje vežu na žiadnom zo svojich k^2 políčok. (Chorvátsko)

3. V konvexnom štvoruholníku $ABCD$ platí $|\angle ABC| = |\angle CDA| = 90^\circ$. Bod H je pätou kolmice z bodu A na priamku BD . Body S, T ležia postupne na stranách AB, AD , pričom bod H je vnútorným bodom trojuholníka SCT a platí

$$|\angle CHS| - |\angle CSB| = 90^\circ, \quad |\angle THC| - |\angle DTC| = 90^\circ.$$

Dokážte, že priamka BD sa dotýka kružnice opísanej trojuholníku TSH . (Irán)

4. Na strane BC daného ostrouhlého trojuholníka ABC ležia body P, Q , pričom $|\angle PAB| = |\angle BCA|$ a $|\angle CAQ| = |\angle ABC|$. Body M a N ležia postupne na priamkach AP a AQ tak, že bod P je stredom úsečky AM a bod Q je stredom úsečky AN . Dokážte, že priamky BM a CN sa pretínajú na kružnici opísanej trojuholníku ABC . (Gruzínsko)

5. Banka v Kapskom Meste razí mince s hodnotou $1/n$ pre každé kladné celé číslo n . Majme konečnú kolekciu takýchto mincí (nie nutne s rôznymi hodnotami), ktorá má celkovú hodnotu nanajvýš $99 + \frac{1}{2}$. Dokážte, že túto kolekciu možno rozdeliť na 100 alebo menej častí tak, aby každá časť mala celkovú hodnotu nanajvýš 1. (Luxembursko)

6. Hovoríme, že priamky v rovine sú vo *všeobecnej polohe*, ak žiadne dve nie sú rovnobežné a žiadne tri neprechádzajú jedným bodom. Množina priamok vo všeobecnej polohe rozdeľuje rovinu na oblasti, z ktorých niektoré majú konečný obsah; nazývame ich *konečné oblasti* prislúchajúce danej množine priamok. Pre každé dostatočne veľké n dokážte, že v ľubovoľnej množine n priamok vo všeobecnej polohe je možné zafarbiť aspoň \sqrt{n} priamok modrou farbou tak, že žiadna z prislúchajúcich konečných oblastí nebude mať celú hranicu modrú. (Rakúsko)